

卫生专业人士的态度和行为

	完全没有	非常少	有点	中等	很多	大量	非常多
17. 非PICU医生（如外科医生、消化科医生）要求患者不要进行肠内营养	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. 护士没有按照喂养方案推进喂养	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. 因腹泻而停止肠内营养	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. 害怕因积极的肠内营养而引起不良反应	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. 由于一些床边操作流程而停止肠内喂养，如物理治疗、翻身、给予某些药物。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. 由于某些特殊的诊疗或手术而导致肠内营养停止	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. 对PICU目前的营养指南缺乏了解	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. PICU团队普遍认为，提供足够的营养影响不了患者的预后	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. 母乳喂养的母亲缺乏专业人员的健康指导和支持	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

第二部分：完成本次调查的卫生专业人士的个人资料
请勾选最适合你的方格。

- 营养师
- 护士
- 医生

您在PICU工作多久了？

- 0 - 5年
- 6 - 10年
- 11 - 15年
- 大于15年

您的PICU在哪个国家？

您在哪种类型的PICU工作？

- 综合PICU
- 综合和心脏重症监护混合的PICU
- 心脏重症监护的PICU
- 和NICU混合的PICU
- 其他（请注明）

你认为还有哪些障碍因素是此问卷未提及的？